

### • Categorie di punteggio •

- **Categoria 1:** Il paziente potrebbe essere controllato con l'attuale regime terapeutico. Si suggerisce di continuare a monitorare il paziente sulla base del miglior trattamento medico e del Suo giudizio professionale / delle linee guida.
- **Categoria 2:** Il paziente potrebbe non essere controllato con l'attuale regime terapeutico. Tuttavia, ulteriori benefici potrebbero essere ottenuti da un'ulteriore ottimizzazione del trattamento. In questa fase potrebbero non essere necessarie le terapie avanzate. Tuttavia, si suggerisce di utilizzare l'anamnesi del paziente, le preferenze terapeutiche e il Suo miglior giudizio medico sulle raccomandazioni terapeutiche.
- **Categoria 3:** Il paziente potrebbe non essere controllato con l'attuale regime terapeutico e potrebbe trarre beneficio da una terapia avanzata. Si consiglia di valutare l'idoneità alle terapie avanzate in base all'anamnesi del paziente, alle preferenze terapeutiche e al Suo miglior giudizio medico sulle raccomandazioni terapeutiche.

### Sezione 1 Punteggio

#### Valutazione dell'inadeguato controllo con la terapia orale

- Assunzione di levodopa orale  $\geq 5$  volte/giorno
- $\geq 2$  ore di "off" /giorno
- Presenza di fluttuazioni motorie imprevedibili
- Presenza di discinesia fastidiosa
- Limitazioni in  $\geq 1$  attività della vita quotidiana

Se la risposta è **NO** a **TUTTE** le domande della Sezione 1, il paziente è classificato come [Categoria 1](#)

Se la risposta è **SÌ** a **UNA QUALSIASI** domanda nella Sezione 1, il paziente continua con la **Sezione 2**

### Sezione 2 Punteggio

#### Punteggio di frequenza

- 0 Mai
- 1 Raramente
- 2 Qualche volta
- 3 Sempre

#### Punteggio di gravità

- 1 Lieve
- 2 Moderato
- 3 Grave

#### Livello di indipendenza (attività della vita quotidiana)

- 0 Indipendente in tutte le attività
- 1 Indipendente nella maggior parte delle attività
- 2 Necessita di assistenza / dipendenza per alcune attività
- 3 Totalmente dipendente in tutte le attività

#### Cadute al mese

- 0 Nessuna
- 1 1
- 2 2 o più

- Se nella **Sezione 1**, è stata selezionata una dose di levodopa  $\leq 3$  **ED** è stato selezionato “Sì” per UNA QUALSIASI delle altre categorie (ad es.,  $\geq 2$  ore “Off” /giorno, presenza di fluttuazioni motorie imprevedibili, presenza di discinesia fastidiosa, limitazioni nelle attività della vita quotidiana) il paziente sarà classificato come [Categoria 2](#), indipendentemente dalla frequenza / gravità dei sintomi.
- Se è stato selezionato “Sì” per UNA QUALSIASI delle categorie (ad es.,  $\geq 2$  ore “Off” /giorno, presenza di fluttuazioni motorie imprevedibili, presenza di discinesia fastidiosa, limitazioni nelle attività della vita quotidiana) nella Sezione 1 **ED** è stata selezionata una dose di levodopa  $\geq 4$ , fare riferimento all'algoritmo nella pagina seguente per la classificazione delle categorie.

### ≥4 dosi di levodopa e:

#### Punteggio ≥ 3 (frequenza x gravità) per:

- Fluttuazioni motorie imprevedibili\*
- Sintomi Off “non-motori”
- Freezing dell’andatura in “Off”
- Allucinazioni / psicosi senza consapevolezza

Categoria

3

#### Punteggio < 3 (frequenza x gravità) per:

- Fluttuazioni motorie imprevedibili\*
- Sintomi Off “non-motori”
- Freezing dell’andatura in “Off”
- Allucinazioni / psicosi senza consapevolezza

Categoria

2

#### Un punteggio di 2 o 3 per:

- Tempo in “Off”\*
- Discinesia fastidiosa\*
- Peggioramento delle attività della vita quotidiana\*

Categoria

3

\*Queste domande verranno ignorate nella Sezione 2 se la risposta nella Sezione 1 è **No**.

### ≥4 dosi di levodopa e:

#### Un punteggio <u>2</u> per:

- Tempo in “Off”\*
- Discinesia fastidiosa\*
- Peggioramento delle attività della vita quotidiana\*

Categoria

2

#### Un punteggio di 1 o 2 per:

- Cadute

Categoria

3

#### Un punteggio di 0 per:

- Cadute

Categoria

2

\*Queste domande verranno ignorate nella Sezione 2 se la risposta nella Sezione 1 è **No**.

- **Nota:** i punteggi per “**Distonia con dolore**” e “**Disturbo del controllo degli impulsi**” sono stati forniti per Sua informazione in modo da poter prendere in considerazione questi criteri durante la valutazione del paziente per le raccomandazioni di trattamento. La gravità e la frequenza di questi punteggi non influiscono sul risultato ottenuto con questo strumento.