

• Categorie di punteggio •

- **Categoria 1:** Il paziente potrebbe essere controllato con l'attuale regime terapeutico. Si suggerisce di continuare a monitorare il paziente sulla base del miglior trattamento medico e del Suo giudizio professionale/ delle linee guida cliniche.
- **Categoria 2:** Il paziente potrebbe non essere controllato con l'attuale regime terapeutico. Tuttavia, ulteriori benefici potrebbero essere ottenuti da un'ulteriore ottimizzazione del trattamento. Al momento potrebbero non essere necessarie le terapie dispositivo-assistite. Tuttavia, si suggerisce di tener conto dell'anamnesi del paziente, delle preferenze terapeutiche e il Suo miglior giudizio medico per la raccomandazione terapeutica.
- **Categoria 3:** Il paziente potrebbe non essere controllato con l'attuale regime terapeutico e potrebbe trarre beneficio da una terapia dispositivo-assistita. Si consiglia di valutare l'idoneità alle terapie dispositivo-assistite in base all'anamnesi del paziente, alle preferenze terapeutiche e al Suo miglior giudizio medico per la raccomandazione terapeutica.

© 2019 AbbVie Inc. North Chicago, IL 60064. All rights reserved. This information is intended only for non-commercial use by healthcare professionals and is not offered as or intended to be medical advice for any particular patient. This information is not intended for patients. Only a healthcare professional exercising independent clinical judgment can make decisions regarding appropriate patient care and treatment options considering the unique characteristics of each patient. Use of the AbbVie name, its logos, other trademarks, trade names or trade dress is prohibited without the prior written authorization of AbbVie, except to identify the product or services of AbbVie.

Sezione 1 Punteggio

Valutazione dell'inadeguato controllo con la terapia orale

- Assunzione orale levodopa ≥ 5 volte/giorno
- ≥ 2 ore in fase "off"/giorno
- Presenza di fluttuazioni motorie imprevedibili
- Presenza di discinesia fastidiosa
- Limitazioni in ≥ 1 attività della vita quotidiana

Se la risposta è **NO** a **TUTTE** le domande della Sezione 1, il paziente è classificato come [Categoria 1](#)

Se la risposta è **SÌ** a **UNA QUALSIASI** domanda nella Sezione 1, il paziente continua con la Sezione 2

© 2019 AbbVie Inc. North Chicago, IL 60064. All rights reserved. This information is intended only for non-commercial use by healthcare professionals and is not offered as or intended to be medical advice for any particular patient. This information is not intended for patients. Only a healthcare professional exercising independent clinical judgment can make decisions regarding appropriate patient care and treatment options considering the unique characteristics of each patient. Use of the AbbVie name, its logos, other trademarks, trade names or trade dress is prohibited without the prior written authorization of AbbVie, except to identify the product or services of AbbVie.

Sezione 2 Punteggio

Punteggio di frequenza

- 0 Mai
- 1 Raramente ($\leq 1/$ settimana)
- 2 Qualche volta (più volte alla settimana)
- 3 Sempre (ogni giorno)

Punteggio di gravità

- 1 Lieve
- 2 Moderato
- 3 Grave

Livello di indipendenza (attività della vita quotidiana)

- 0 Indipendente in tutte le attività
- 1 Indipendente nella maggior parte delle attività
- 2 Necessita di assistenza/dipendente per alcune attività
- 3 Totalmente dipendente in tutte le attività

Cadute al mese

- 0 Nessuna
- 1 1
- 2 2 o più

- Se nella **Sezione 1**, è stata selezionata una dose di levodopa ≤ 3 **ED** è stato selezionato “Sì” per **UNA QUALSIASI** delle altre categorie (ad es, ≥ 2 ore in fase “Off”/giorno, presenza di fluttuazioni motorie imprevedibili, presenza di discinesia fastidiosa, limitazioni nelle attività della vita quotidiana) il paziente sarà classificato come [Categoria 2](#), indipendentemente dalla frequenza/gravità dei sintomi.
- Se è stato selezionato “Sì” per **UNA QUALSIASI** delle categorie (ad es, ≥ 2 ore in fase “Off”/giorno, presenza di fluttuazioni motorie imprevedibili, presenza di discinesia fastidiosa, limitazioni nelle attività della vita quotidiana) nella Sezione 1 **ED** è stata selezionata una dose di levodopa ≥ 4 , si prega di fare riferimento all'algoritmo nella pagina seguente per la classificazione delle categorie.

© 2019 AbbVie Inc. North Chicago, IL 60064. All rights reserved. This information is intended only for non-commercial use by healthcare professionals and is not offered as or intended to be medical advice for any particular patient. This information is not intended for patients. Only a healthcare professional exercising independent clinical judgment can make decisions regarding appropriate patient care and treatment options considering the unique characteristics of each patient. Use of the AbbVie name, its logos, other trademarks, trade names or trade dress is prohibited without the prior written authorization of AbbVie, except to identify the product or services of AbbVie.

≥4 dosi di levodopa e:

Punteggio (frequenza x gravità) ≥ 3 per:

- Fluttuazioni motorie imprevedibili*
- Sintomi “Off” non-motori
- Freezing of gait in fase “Off”
- Allucinazioni/psicosi senza consapevolezza

Categoria

3

Punteggio (frequenza x gravità) < 3 per:

- Fluttuazioni motorie imprevedibili*
- Sintomi “Off” non-motori
- Freezing of gait in fase “Off”
- Allucinazioni/psicosi senza consapevolezza

Categoria

2

Un punteggio di 2 o 3 per:

- Tempo in fase “Off”*
- Discinesia fastidiosa*
- Peggioramento delle attività della vita quotidiana*

Categoria

3

*Queste domande verranno ignorate nella Sezione 2 se la risposta nella Sezione 1 è **No**.

© 2019 AbbVie Inc. North Chicago, IL 60064. All rights reserved. This information is intended only for non-commercial use by healthcare professionals and is not offered as or intended to be medical advice for any particular patient. This information is not intended for patients. Only a healthcare professional exercising independent clinical judgment can make decisions regarding appropriate patient care and treatment options considering the unique characteristics of each patient. Use of the AbbVie name, its logos, other trademarks, trade names or trade dress is prohibited without the prior written authorization of AbbVie, except to identify the product or services of AbbVie.

≥4 dosi di levodopa e:

Un punteggio <u>2</u> per:

- Tempo in fase “Off”*
- Discinesia fastidiosa*
- Peggioramento delle attività della vita quotidiana*

Categoria

2

Un punteggio di 1 o 2 per:

- Cadute

Categoria

3

Un punteggio di 0 per:

- Cadute

Categoria

2

*Queste domande verranno ignorate nella Sezione 2 se la risposta nella Sezione 1 è **No**.

- **Si prega di notare che:** i punteggi per “**Distonia con dolore**” e “**Disturbo del controllo degli impulsi**” sono stati forniti per Sua informazione in modo da poter prendere in considerazione questi criteri durante la valutazione del paziente per le raccomandazioni terapeutiche. La gravità e la frequenza di questi punteggi non influiscono sul risultato ottenuto con questo strumento.

© 2019 AbbVie Inc. North Chicago, IL 60064. All rights reserved. This information is intended only for non-commercial use by healthcare professionals and is not offered as or intended to be medical advice for any particular patient. This information is not intended for patients. Only a healthcare professional exercising independent clinical judgment can make decisions regarding appropriate patient care and treatment options considering the unique characteristics of each patient. Use of the AbbVie name, its logos, other trademarks, trade names or trade dress is prohibited without the prior written authorization of AbbVie, except to identify the product or services of AbbVie.